

事ハ疑ヒナイ事デ、中間ト思ハレル性質ヲ持ツタモノガアルトノ理由デ、全部ヲ以前ノ如ク *Geum* トシテ大キク取扱フトイフノナラ確カニ一面ノ眞理ガアルガ、*Geum* ノ中ニ *Oreogeum* ナル群ヲ入レテ置キナガラ、みやまだいこんさうヲ *Acomastylis* ニ入レル事ハ適當デナイト思フ。*Geum*, *Oreogeum*, *Acomastylis*, *Parageum* ノ間ノ隔リヲ考ヘル時ニ、私ハ花柱ガ果實トナツテ延長スルカシナイカトイフ性質ハ可成リ重要ナモノト思フカラ、*Parageum* ヲ *Acomastylis* カラ獨立サセルノガ妥當デアル事ヲ主張スル。

尙 BOLLE ハ本州中部ノみやまだいこんさうトアラスカ産ノモノト比較シテ、本州ノモノハ葉ノ鋸齒ガ粗大デ花柱ハ中央以下ニノミ毛ガアルガ、北米ノモノハ葉ノ鋸齒ガ細カク花柱ハ上部マデ毛ガ生エテキルトイフノデ、本州ノモノヲ新種トシテ *Acomastylis nipponica* BOLLE トシタ。然シ上記ノ性質ハ千島・アリューシャン等ノ中間地帯ノ標本ヲ見レバ分ル如ク餘リ一定シタモノデハナク、唯ソノ基本形ニ於テハソノ差異ガ認めラレルノデ私ハみやまだいこんさうヲ北米ノモノノ變種トスルノガ適當ト考ヘ、次ノ如ク學名ヲ改メル。千島ノモノハ本州ノモノニ比シ概シテ葉厚ク毛ガ多イガ變種トシテ區別スル程デモナイ。

(原 寛)

Parageum calthifolium NAKAI et HARA in Bot. Mag. Tokyo XLIX, p. 125 (1935)
var. *nipponicum* (BOLLE) HARA, comb. nov.

Syn. *Geum calthifolium* (non MENZIES) auct. plur. quoad pl. ex Japonia.

Acomastylis nipponica F. BOLLE in FEDDE, Rep. Sp. Nov. Beihefte LXXII,
p. 82 (1933).

Nom. Jap. *Miyama-daikonsô*.

Hab. Shikoku, Honshu, Yezo et Kuriles.

(H. HARA)

○やへざきしなのきんばい(新稱)

普通品ハ花瓣様萼片 5-7 デアルガ、コノモノデハソノ外ニ 10-15 個ノ同質ノ花瓣ガアル。萼片ニ比シテ同長ナレド幅ハ遙カニ狭ク大體 25×10 mm. デ倒卵狀橢圓形デアル。コレハ明カニ密腺狀ノ花瓣ノ變形デアルガ、本種ノ特徴トスル雄蕊ヨリハ短カイノ原則ヲスツカリ壞シテ約 4 倍長ニナツテ居ル。シカシ莖葉ノ形質ハしなのきんばいデアルカラソレノ forma ニ抜ツダ。羽前飯豊山デ結城嘉美氏採集、昭和八年八月 No. 1729 ニ基ツク。同氏ハ最初ソノ一株ヲ採集サレシ後二回同個所ヲ採サレタガ遂ニ見當ラナカツタトノコトデアル。

(前川文夫)

Trollius japonicus MIQUEL forma *plenus* F. MAEKAWA form. nov.

Flores ca 5.5 cm. lati. Glandulae ±15, magnae petaloideae obovato-oblongae flavae ca. 25 mm. longae 10 mm. latae, staminibus 4-plo longiores. Folia ut in typico.

Nom. Jap. *Yaezaki-Shinanokimbai* (nom. nov.)

Hab. Hondo. prov. Uzen, Mt. Iide (Y. YUKI, Aug. 1929, No. 1729—Typus).

(F. MAEKAWA).